

कोलॉनोस्कोपी परीक्षण के लिये आपका मलाशय खाली होना चाहिये, ताकि डॉक्टर आपकी बड़ी आँत को साफ़-साफ़ देख सकें।

एक्सिलाइट या कोलॉवॉश नामक घुट्टी सभी मुख्य दवा की दुकानों में उपलब्ध है जिसमें ४५ मिली की दो शीशियों का एक पैकेट होता है।

### परीक्षण से एक दिन पहले:

- शाम ५-६ बजे के बीच – एक्सिलाइट या कोलॉवॉश (४५ मिली) की एक शीशी को नींबू के रस की एक बोतल /लिमका (३०० मिली) में मिलायें और इसे ३०-४० मिनट तक धीरे-धीरे पियें।
- आपको कुछ देर में दस्त होने लगेंगे।
- इस अवधि में शरीर में पानी की मात्रा बनाये रखने के लिये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेय पदार्थ पियें। रात के समय आप चावल/दाल/खिचड़ी जैसी हल्की चीज़ें खा सकते हैं।
- रोटी/चपाती/हरी सब्जियाँ या फल न खायें।

### परीक्षण के दिन:

- आप सुबह ६ बजे चाय/बिस्किट खा सकते हैं।
- सुबह ७-८ के बीच: एक्सिलाइट या कोलॉवॉश (४५ मिली) की दूसरी शीशी को नींबू के रस की एक बोतल /लिमका (३०० मिली) में मिलायें और इसे ३०-४० मिनट तक धीरे-धीरे पियें।
- कुछ ही देर में आपको पतले दस्त होने लगेंगे।
- आप रक्तचाप, मधुमेह या हृदयरोग की दवाएं सुबह नियमित समय पे ले सकते हैं।
- इस अवधि में शरीर में पानी की मात्रा बनाये रखने के लिये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ पियें।
- इसके बाद कुछ न खाना बेहतर होगा।

आपकी जांच की तिथि: ----- समय: -----

